

# Cardolax® 100mg

Comprimé

**Veillez lire attentivement cette notice avant de prendre ce médicament car elle contient des informations importantes pour vous.**

- Gardez cette notice. Vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre **CARDOLAX®**.
- Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez pas à d'autres personnes. Il pourrait leur être nocif, même si les signes de leur maladie sont identiques aux vôtres.
- Si des effets indésirables surviennent, veuillez contacter immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

## CARDOLAX® 100 mg

**Classe pharmacothérapeutique**

bétabloquant sélectif - code ATC : C07AB02

**Composition**

**CARDOLAX® 100 mg**

Substance active : Tartrate de métoprolol ..... 100 mg

Excipients: Cellulose microcristalline, lactose monohydraté, glycolate d'amidon sodique, polyvinylpyrrolidone (povidone), Dioxyde de silicium colloïdal, stéarate de magnésium..... Qsp 1 comprimé.

Excipients à effet notoire : lactose monohydraté

**Indications thérapeutiques :**

Le métoprolol réduit les effets sur le cœur des hormones de stress liées à l'effort physique et mental. Par conséquent, le cœur bat plus lentement (la fréquence cardiaque est réduite) dans ces situations. La réduction de la charge de travail du cœur prévient également l'apparition d'un angor.

**CARDOLAX® 100 mg**, comprimé est utilisé dans :

- le traitement de l'hypertension artérielle et la prévention des symptômes de l'angor,
- le traitement de certains types de palpitations,
- le traitement de certains types d'activité cardiaque irrégulière (arythmie),
- le traitement du métabolisme accru (thyrotoxicose).

Chez les patients déjà victimes d'une crise cardiaque, **CARDOLAX® 100 mg**, comprimé réduit le risque de décès et de nouvelle crise cardiaque. Il peut aussi être utilisé pour prévenir la migraine.

**Posologie :**

Veillez à toujours prendre ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. Vérifiez auprès de votre médecin ou pharmacien en cas de doute.

Les comprimés doivent être pris l'estomac vide et avalés avec au moins un demi-verre de liquide.

**Si vous arrêtez de prendre CARDOLAX® 100 mg, comprimé**

N'interrompez pas le traitement par **CARDOLAX® 100 mg**, comprimé sans en discuter au préalable avec votre médecin, car certains symptômes (notamment les palpitations et l'angor) peuvent s'aggraver en cas d'arrêt brutal du médicament.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou votre pharmacien.

**Mode d'administration :**

Les gélules de **CARDOLAX® 100 mg** sont à utiliser par voie orale .

**CARDOLAX® 100 mg** doivent être pris l'estomac vide et avalés avec au moins un demi-verre de liquide

ADRESSEZ-VOUS À VOTRE MÉDECIN OU LE PHARMACIEN SI VOUS AVEZ D'AUTRES QUESTIONS SUR L'UTILISATION DE CE MÉDICAMENT.

**Contre – indications :**

**Ne prenez jamais de CARDOLAX® 100 mg, comprimé:**

- si vous êtes allergique au tartrate de métoprolol, à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique 6, ou à d'autres médicaments similaires (bêtabloquants) ;
- si vous souffrez d'une insuffisance cardiaque non traitée ;
- si vous présentez un bloc cardiaque grave et/ou une fréquence cardiaque très basse ;
- si vous présentez une pression artérielle très basse.

**Précautions d'emploi et mises en garde spéciales :**

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre **CARDOLAX® 100 mg**, comprimé si vous présentez l'une des pathologies suivantes :

- asthme ;
- problèmes importants avec rétrécissement des bronches ;
- troubles aigus et sévères accompagnés de fortes concentrations de substances acides dans l'organisme ;
- angor vasospastique (angor de Prinzmetal) ;
- altération sévère de la fonction rénale ;
- claudication intermittente. Cette pathologie est susceptible de s'aggraver lorsque la pression artérielle diminue en raison du traitement par **CARDOLAX® 100 mg**, comprimé

**Enfants et adolescents**

Sans objet.

**Autres médicaments et CARDOLAX® 100 mg, comprimé**

Informez votre médecin ou pharmacien si vous prenez, avez récemment pris ou pourriez prendre tout autre médicament. Certains médicaments peuvent affecter ou être affectés par le traitement par **METOPROLOL CARDOLAX® 100 mg** comprimé, notamment les médicaments suivants :

- propafénone, amiodarone, quinidine, vérapamil, diltiazem, clonidine, disopyramide et hydralazine, digitaliques/digoxine (médicaments utilisés dans le traitement des maladies cardiovasculaires) ;
- dérivés de l'acide barbiturique (médicaments contre l'épilepsie) ;
- médicaments anti-inflammatoires (par exemple indométacine et célécoxib) ;
- adrénaline (médicament utilisé dans le traitement des chocs aigus et des réactions allergiques graves) ;
- phénylpropanolamine (médicament luttant contre le gonflement de la muqueuse nasale) ;
- diphenhydramine (médicament utilisé dans le traitement des allergies) ;
- terbinafine (médicament utilisé dans le traitement des infections fongiques de la peau) ;
- rifampicine (médicament utilisé dans le traitement de la tuberculose) ;
- autres bêtabloquants (par exemple gouttes ophtalmiques) ;
- inhibiteurs de la monoamine-oxydase (médicaments utilisés dans le traitement de la dépression et de la maladie de Parkinson) ;
- agents anesthésiques volatils (médicaments utilisés pour induire une anesthésie) ;
- comprimés utilisés dans le traitement du diabète (antidiabétiques oraux) ;
- cimétidine (médicament utilisé dans le traitement des brûlures d'estomac et des remontées acides), antidépresseurs (paroxétine, fluoxétine et sertraline).

**CARDOLAX® 100 mg, comprimé avec des aliments et boissons**

**CARDOLAX® 100 mg**, comprimé doit être pris l'estomac vide.

Grossesse et allaitement

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

**CARDOLAX® 100 mg**, comprimé ne vous sera prescrit pendant votre grossesse et l'allaitement qu'en cas de nécessité absolue.

Les bêtabloquants, y compris **CARDOLAX® 100 mg**, comprimé, peuvent avoir un effet délétère sur le fœtus et entraîner une naissance prématurée. **CARDOLAX® 100 mg**, comprimé est susceptible de ralentir l'activité cardiaque du fœtus et du nouveau-né.

**CARDOLAX® 100 mg**, comprimé est excrété dans le lait maternel et pourrait affecter le nourrisson allaité.

**Conduite de véhicules et utilisation de machines**

Des vertiges ou de la fatigue sont susceptibles de survenir au cours du traitement par **CARDOLAX® 100 mg** comprimé et votre vigilance pourrait en être altérée.

Vous seul(e) avez la responsabilité de décider si vous êtes apte à conduire un véhicule à moteur ou à réaliser d'autres tâches exigeant une concentration accrue. En raison de leurs effets ou de leurs effets indésirables, votre utilisation des médicaments constitue l'un des facteurs susceptibles de réduire votre capacité à réaliser ces activités en toute sécurité.

Vous trouverez des descriptions de ces effets dans d'autres rubriques. Lisez l'intégralité des informations contenues dans cette notice afin d'y trouver des conseils.

Adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien en cas de doute.

**CARDOLAX® 100 mg, comprimé contient du sodium**

Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par comprimé, c'est-à-dire qu'il est essentiellement « sans sodium ».

**Effets indésirables :**

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

**Très fréquents (susceptibles de toucher plus de 1 personne sur 10) :** fatigue.

**Fréquents (susceptibles de toucher jusqu'à 1 personne sur 10) :** maux de tête, vertiges, pieds et mains froids, fréquence cardiaque lente, palpitations, douleurs à l'estomac, nausées, vomissements, diarrhée, constipation, essoufflement.

**Peu fréquents (susceptibles de toucher jusqu'à 1 personne sur 100) :** douleurs thoraciques, prise de poids, troubles du sommeil, picotements au niveau de la peau, aggravation des symptômes touchant les voies respiratoires, réactions cutanées d'hypersensibilité, rétention hydrique, aggravation temporaire de l'insuffisance cardiaque, cauchemars, dépression. La pression artérielle peut diminuer de manière importante lors d'une crise cardiaque.

**Rares (susceptibles de toucher jusqu'à 1 personne sur 1 000) :** augmentation de la transpiration, chute des cheveux, altérations du goût, altération transitoire de la fonction sexuelle, troubles de la mémoire, confusion, nervosité, anxiété, hallucinations, aggravation d'un psoriasis, hypersensibilité à la lumière solaire, baisse du nombre de plaquettes (thrombopénie), ralentissement de la fonction cardiaque, troubles du rythme cardiaque, syncopes, effets sur le foie, troubles visuels, bourdonnement dans les oreilles.

**Les réactions suivantes ont été rapportées dans des cas isolés :** douleurs articulaires, crampes musculaires, bouche sèche, irritation et sécheresse oculaires, rhinite allergique, troubles de la concentration, mort des tissus (gangrène) chez les patients présentant des troubles graves de la circulation sanguine. La sécheresse buccale peut majorer le risque de caries dentaires. Un brossage des dents soigneux et

régulier et des soins dentaires sont par conséquent essentiels.

**Déclaration des effets secondaires**

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Centre National de pharmacovigilance et de matériovigilance

- Site internet : [www.cnpm.org.dz](http://www.cnpm.org.dz)

- Adresse : CNPM, sis,route petit staouali (NIPA) dely Ibrahim –Alger 16320

-Tel/Fax : (213)23367502 / (213)23367527 / (213)23367529

-Email : [cnpm@cnpm.org.dz](mailto:cnpm@cnpm.org.dz)

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

**Surdosage**

**Si vous avez pris plus de CARDOLAX® 100 mg, comprimé que vous n'auriez dû**

Si vous avez pris plus de **CARDOLAX® 100 mg**, comprimé que vous n'auriez dû, ou si un enfant a pris ce médicament par accident, veuillez contacter votre médecin, un hôpital ou un centre antipoison afin d'obtenir un avis sur le risque encouru et des conseils relatifs à la marche à suivre.

**Si vous oubliez de prendre CARDOLAX® 100 mg, comprimé**

Ne prenez pas de dose double pour compenser le comprimé que vous avez oublié de prendre.

**Précautions particulières de conservation :**

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

N'utilisez pas ce médicament après la date de péremption indiquée sur la boîte. La date de péremption fait référence au dernier jour de ce mois.

Pas de précautions particulières de conservation.

Ne jetez aucun médicament au tout-à-l'égout ou avec les ordures ménagères. Demandez à votre pharmacien d'éliminer les médicaments que vous n'utilisez plus. Ces mesures contribueront à protéger l'environnement.

**Nature et contenu :**

Boîte en carton de 30 comprimés avec notice.

**Conditions de délivrance**

Liste I.



**Nom et adresse du titulaire et l'exploitant de la décision d'enregistrement :**

**SARL World Medicine Limited**

Zone d'activités Oued Tlelat, N°07, 08 et 09 Ilot N°08 , Commune Oued Tlelat, Oran.

**Nom et adresse des participants dans la fabrication en gros, conditionnement primaire et secondaire et libération des lots :**

**SARL World Medicine Limited**

Site de fabrication 1, Zone d'activités Oued Tlelat, N°06 Ilot 06, Commune Oued Tlelat, Oran

**D.E. N°:** 24/06 F 204/544

**Date de révision de la notice :** Juin 2023

# كاردولاكس® 100 مغ

قرص

الرجاء قراءة النشرة قبل استعمال هذا الدواء حيث أنها تحتوي على معلومات جد هامة.

- احتفظوا بهذه النشرة فقد تحتاجون إلى إعادة قراءتها مستقبلا.

- استشيروا طبيبكم أو صيدليكم قبل أخذ كاردولاكس م.  
- وصف لكم هذا الدواء شخصيا. لا تعطوه أبدا لأي شخص آخر فقد يكون ذلك مضرا به حتى ولو كانت لديه نفس الأعراض.  
- في حالة حدوث أي آثار جانبية، الرجاء إعلام طبيبكم أو صيدليكم.

## كاردولاكس® 100 مغ

الفئة العلاجية الدوائية:

حاصرات مستقبل بيتا - رمز: C07AB02 ATC:

التركيبية:

كاردولاكس® 100 مغ

المادة الفعالة: تارترات ميتوبولول..... 100 مغ  
سواغات: السليلوز الميكروستالي، سكر حليب (لاكتوز) احادي الادمهة، غليكوت نشاء الصوديوم، بولي فاينيل بيروليدون (بوفيدون)، ثاني أكسيد السيليكون الغرواني، ستيرات المغنسيوم. كمية كافية للقرص الواحد 1

سواغات ذات تأثير معروف: سكر حليب (لاكتوز) احادي الادمهة

مؤشرات علاجية:

يقلل ميتوبولول من تأثيرات هرمونات التوتر على القلب المرتبطة بالجهد البدني والعقلي، وبالتالي، ينبض القلب بشكل أبطأ (ينخفض معدل ضربات القلب) في هذه الحالات، كما أن تقليل عبء عمل القلب يمنع ظهور الذبحة الصدرية. يستعمل كاردولاكس® 100 مغ قرص في الحالات التالية :

- علاج ارتفاع ضغط الدم والوقاية من أعراض الذبحة الصدرية.  
- علاج أنواع معينة من الخفقان.  
- علاج أنواع معينة من نشاط القلب غير المنتظم (عدم انتظام ضربات القلب).

- علاج زيادة التمثيل الغذائي (التسمم الدرقي).

- بالنسبة للمرضى الذين أصيبوا بنوبة قلبية و نوبة من قبل، يقلل كاردولاكس® 100 مغ، من خطر الوفاة و نوبة قلبية جديدة. كما يمكن استخدامه للوقاية من الصداع النصفي.

الجرعة:

احرصوا دائما على تناول هذا الدواء تماما كما أخبركم طبيبكم، استشيروا طبيبكم أو صيدليكم إذا كان لديكم أدنى شك. يجب تناول الأقراص على معدة فارغة و ابتلاعها مع ما لا يقل عن نصف كوب من السائل.

إذا توقفت عن تناول كاردولاكس® 100 مغ، قرص

لا تتوقفوا عن تناول كاردولاكس® 100 مغ، قرص دون مناقشة الأمر أولا مع طبيبكم، لأن بعض الأعراض (خاصة الخفقان و الذبحة الصدرية) قد تتفاقم في حالة التوقف المفاجئ عن تناول الدواء.

إذا كان لديكم أي أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء، اسألوا طبيبكم أو صيدليكم.

كيفية تناول:

تأخذ أقراص كاردولاكس® 100 مغ عن طريق الفم. يجب تناول كاردولاكس® 100 مغ على معدة فارغة و ابتلاعه مع نصف كوب من السائل على الأقل

إذا ما كان لديكم أسئلة أخرى حول استخدام هذا الدواء فالرجاء استشارة طبيبكم أو صيدليكم.

مضادات الاستعمال:

لا تأخذوا أبدا كاردولاكس® 100 مغ قرص في الحالات التالية:

• إذا كنتم تعانيون من حساسية تجاه تارترات ميتوبولول أو لأي من المكونات الأخرى لهذا الدواء المذكورة في القسم 6، أو لأدوية أخرى مماثلة (حاصرات بيتا)؛  
• إذا كنتم تعانيون من قصور القلب غير المعالج.  
• إذا كنتم تعانيون من إحصار حاد في القلب و / أو معدل ضربات قلب منخفض جدا؛  
• إذا كنتم تعانيون من انخفاض شديد في ضغط الدم.  
تحذيرات الاستعمال و احتياطات خاصة:  
تحدثوا إلى طبيبكم أو صيدليكم قبل تناول كاردولاكس® 100 مغ، قرص إذا كان لديكم أحد الأمراض التالية:

الربو؛

مشاكل كبيرة مع تضيق القصبات الهوائية؛  
اضطرابات حادة و شديدة مصحوبة بتركيزات عالية من المواد الحضية في الجسم؛  
الذبحة الصدرية الوعائية (ذبحة برنزميتال) ؛

ضعف شديد في وظائف الكلى،  
العرج المتقطع. من المحتمل أن تتفاقم هذه الحالة المرضية عندما ينخفض ضغط الدم بسبب العلاج باستخدام كاردولاكس® 100 مغ قرص.

الأطفال والمراهقون

غير قابل للتطبيق.

الأدوية الأخرى و كاردولاكس® 100 مغ، قرص

أخذ طبيبكم أو الصيدلي إذا كنت تتناول أو تناولت مؤخرا أو قد تتناول أي أدوية أخرى.

يمكن أن تؤثر بعض الأدوية أو تتأثر بالعلاج ب كاردولاكس® 100 مغ، قرص وخاصة الأدوية التالية:

بروبوفينون، أمبودرون، كينيدين، فبراباميل، ديلتيازيم، كلونيدين، ديسوبيراميد و هيدرالزين ، ديجيتال / ديجوكسين (الأدوية المستخدمة في علاج أمراض القلب و الأوعية الدموية)؛  
مشقات حمض الباربيتوريك (أدوية ضد الصرع) ؛  
الأدوية المضادة للالتهابات (مثل الإندوميثاسين و السيليكوكسيب).

• الأدرينالين (دواء يستخدم لعلاج الصدمة الحادة و ردود الفعل التحسسية الشديدة).

• فينيل بروبانولامين (دواء ضد انتفاخ الغشاء المخاطي للأنف).

• ديفينيدرامين (دواء يستخدم في علاج الحساسية).

• تيربينافين (دواء يستخدم لعلاج الالتهابات الفطرية للجلد).

• ريفامبسين (دواء يستخدم في علاج السل).

• حاصرات بيتا أخرى (مثل قطرات العين).

• مثبطات مونوامين أوكسيديز (الأدوية المستخدمة لعلاج الاكتئاب و مرض باركنسون).

• عوامل التخدير المتطايرة (الأدوية المستخدمة للحث على التخدير).

• الأقراص المستخدمة في علاج مرض السكري (مضادات السكر عن طريق الفم).

• سيميتيدين (دواء يستخدم لعلاج حرقة المعدة و الارتجاع الحمضي، مضادات الاكتئاب (باروكستين، فلوكستين و سيرترالين).

كاردولاكس® 100 مغ، مع الطعام و الشراب

يجب ان تؤخذ أقراص كاردولاكس® 100 مغ، على معدة فارغة.

الحمل و الرضاعة

إذا كنت حاملا أو مرضعة، تعتقدين أنك حامل أو تخططين للحمل، اسألي طبيبكم أو الصيدلي للحصول على نصيحة قبل تناول هذا الدواء.

لن يتم وصف كاردولاكس® 100 مغ لك أثناء الحمل و الرضاعة الطبيعية إلا في الضرورة القصوى.

يمكن أن يكون لحاصرات بيتا، بما في ذلك أقراص كاردولاكس® 100مغ تأثير ضار على الجنين و تؤدي إلى الولادة المبكرة. من المرجح أن يبطئ كاردولاكس® 100 مغ من نشاط القلب للجنين و الرضع.

يفرز كاردولاكس® 100 مغ، قرص في حليب الثدي و يمكن أن يؤثر على الرضع.

السياقة و استعمال الماكينات

قد يحدث دوار أو إرهاق أثناء العلاج ب كاردولاكس® 100 مغ، قرص و قد يضعف انتباهكم.

أنتم و جدكم المسؤولون عن تقرير ما إذا كنتم لائقين لقيادة سيارة أو أداء مهام أخرى تتطلب تركيزاً متزايدا. أحد العوامل التي قد تقلل من قدرتكم على أداء هذه الأنشطة بأمان هو بسبب آثارها أو ردود الفعل السلبية.

ستجد أوصافا لهذه التأثيرات في أقسام أخرى. اقرأوا جميع المعلومات الواردة في هذه النشرة للحصول على المشورة.

اسألوا طبيبكم أو الصيدلي إذا كان لديكم شك.

يحتوي كاردولاكس® 100 مغ على صوديوم

يحتوي هذا المنتج الطبي على أقل من 1 ملليمول صوديوم (23 مغ لكل قرص، أي بشكل أساسي "خال من الصوديوم".

الأعراض الجانبية:

مثل جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارا جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.

شائعة جدا (من المحتمل أن تؤثر على أكثر من 1 من كل 10 أشخاص): التعب.

شائعة (قد تظهر لدى حتى 1 من كل 10 أشخاص): صداع، دوار، برودة اليدين و القدمين، بطء معدل ضربات القلب، خفقان القلب، الالم في المعدة، غثيان، قيء، إسهال، إمساك، ضيق في التنفس.

غير شائع (قد يؤثر على حتى 1 من كل 100 شخص): ألم في الصدر، زيادة الوزن، صعوبة في النوم، وخز الجلد، تفاقم الأعراض التي تؤثر على الشعب الهوائية، تفاعلات جلدية فرط الحساسية، احتباس السوائل، تدهور مؤقت في قصور القلب، كوابيس، اكتئاب. يمكن أن ينخفض ضغط الدم بشكل ملحوظ أثناء النوبة القلبية.

نادر (قد يؤثر على حتى 1 من كل 1000 شخص): زيادة التعرق، تساقط الشعر، اضطرابات التذوق، تغير مؤقت في الوظيفة الجنسية، مشاكل في الذاكرة، ارتباك، عصبية، قلق، هلوسة، تفاقم الصدفية، فرط الحساسية لأشعة الشمس، انخفاض عدد الصفائح الدموية (قلة الصفائح)، بطء وظائف القلب، اضطرابات ضربات القلب، إغماء، تأثيرات على الكبد، اضطرابات بصرية، طنين في الأذنين.

تم الإبلاغ عن التفاعلات التالية في حالات فردية: آلام المفاصل، تقلصات العضلات، جفاف الفم تهيج العين وجفافها، التهاب الأذن الوسطى، اضطرابات التركيز، موت الأئسجة (الفرغرينا) في المرضى الذين يعانون من اضطرابات الدورة الدموية الشديدة. يمكن أن يزيد جفاف الفم من خطر تسوس الأسنان. لذلك فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة و العناية بالأسنان بحذر و منظم ضروريان.

الإعلان عن الآثار الجانبية:

إذا ظهرت لديكم أي آثار جانبية، تحدثوا إلى طبيبكم أو صيدليكم. هذا ينطبق أيضا على أي آثار ضارة غير مذكورة في هذه النشرة. يمكنكم أيضا الإبلاغ عن الآثار الضارة مباشرة عبر نظام الإبلاغ الوطني: المركز الوطني لليقظة بخصوص العتاد الطبي.

- الموقع الإلكتروني: www.cnpm.org.dz

- العنوان: المركز الوطني لليقظة بخصوص العتاد الطبي، الكائن بطريق سطوالي الصغرى (NIPA) دالي ابراهيم، الجزائر - 16320

- الهاتف/الفاكس:

23367527(213)/23367502(213)

- البريد الإلكتروني: cnpm@cnpm.org.dz

من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، فإنكم تساعدون في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة الدواء.

الجرعة المفردة:

إذا تناولتم أقراص كاردولاكس® 100 مغ أكثر مما ينبغي

إذا تناولتم كاردولاكس® 100 مغ قرص أكثر مما يجب أو إذا تناول طفل هذا الدواء عن طريق الصدفة ، فيرجى الاتصال بطبيبكم أو المستشفى أو مركز مراقبة السموم للحصول على رأي حول المخاطر التي تطوي عليها و نصائح بشأن الإجراء الواجب اتباعه.

إذا نسيتم تناول كاردولاكس® 100 مغ قرص

لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض القرص الذي نسيتم تناوله.

احتياطات خاصة للتخزين:

احفظوا هذا الدواء بعيدا عن روية و متناول أيدي الأطفال. لا تستخدم هذا الدواء بعد انتهاء الصلاحية المدون على العبوة. يشير تاريخ انتهاء الصلاحية إلى اليوم الأخير من نفس الشهر.

لا توجد شروط تخزين خاصة.

لا يجوز التخلص من أي دواء عن طريق مياه الصرف الصحي أو النفايات المنزلية. اسأل الصيدلي عن كيفية التخلص من الأدوية التي لم تعد تستخدمها. ستساعد هذه الإجراءات في حماية البيئة.

الطبيعة والمحتوى:

علبة كرتون بها 30 قرص مع النشرة الإعلامية.

شروط التسليم:

القائمة الأولى.



WORLD MEDICINE

Pharmaceutical Company

اسم و عنوان صاحب ومستقل مقر التسجيل:

ش د م / و ورلد ميدسين ليميتاد.

منطقة النشاطات وادي تليبات ، رقم 07 ، 08 و 09 ، قسم رقم 08، بلدية وادي تليبات، وهران

تسمية و عنوان المشاركين في التصنيع بالجملة، التغليف الأولي والتأني وتحرير الحصص:

ش د م / و ورلد ميدسين ليميتاد

موقع الإنتاج 1، منطقة النشاطات وادي تليبات رقم 06، جزء 06، بلدية وادي تليبات، وهران

مقر التسجيل رقم:

تاريخ مراجعة النشرة: 2014/03/24