

Suspension pour pulvérisation nasale

Composition :

Principe actif :

Fluticasone Propionate 50 microgrammes pour une dose.

Excipients :

La cellulose microcristalline/carmellose sodique, glucose (anhydre), alcool phényléthylique, édétate disodique, polysorbate 80, sorbate de potassium, acide chlorhydrique (concentré), hydroxyde de sodium et de l'eau purifiée.

Excipient à effet notoire : Sorbate de potassium.

FLUTEL® contient du sodium et du glucose. Aucun effet indésirable en ce qui concerne la voie d'administration n'est attendue.

Indications thérapeutiques :

Code ATC : R01AD08

Ce médicament contient un corticoïde (dérivé de cortisone).

C'est un traitement anti-inflammatoire qui s'administre par voie nasale. Il est indiqué :

- chez l'adulte et l'enfant de plus de 12 ans, pour traiter les rhinites allergiques,
- chez l'enfant de 4 à 12 ans, pour traiter uniquement la rhinite allergique saisonnière (rhume des foies),
- chez l'adulte, pour soulager les symptômes liés à la présence de polypes (tumeurs sans gravité se développant sur les muqueuses) dans le nez.

Posologie :

Veillez à toujours utiliser ce médicament en suivant exactement les indications de votre médecin. En cas de doute, demandez l'avis de votre médecin ou de pharmacien. Ne pas augmenter la dose ni la fréquence ou la durée d'administration prescrites par votre médecin.

Rhinite allergique :

• Utilisation chez l'enfant entre 4 et 12 ans (traitement de la rhinite allergique saisonnière uniquement) :

La dose recommandée est de 100 microgrammes par jour, soit 1 pulvérisation dans chaque narine 1 fois par jour le matin.

Ne dépassez pas 1 pulvérisation dans chaque narine, matin et soir.

-La mise en route et la durée du traitement dépendent de l'exposition à la substance responsable de l'allergie.

• Utilisation chez l'adulte et l'enfant de 13 ans et plus :

La dose recommandée est de 200 microgrammes par jour, soit 2 pulvérisations dans chaque narine 1 fois par jour, le matin.

Ne dépassez pas 2 pulvérisations dans chaque narine, matin et soir.

-La mise en route et la durée du traitement dépendent de l'exposition à la substance responsable de l'allergie.

Présence de polypes dans le nez (polyposse nasosinusienne) :

• **Traitement d'attaque :** 400 microgrammes par jour, soit 2 pulvérisations dans chaque narine 2 fois par jour, matin et soir.

• **Traitement d'entretien (traitement régulier) :** une fois les symptômes contrôlés, (en général, après 1 à 2 mois), 200 microgrammes par jour, soit 2 pulvérisations dans chaque narine, 1 fois par jour le matin.

-Dans tous les cas il convient de toujours chercher la dose minimale efficace.

-En cas de persistance des troubles, n'augmentez pas la dose, mais consultez votre médecin.

Mode d'administration :


Voie nasale uniquement.

Ne pas avaler.

Suivre attentivement les conseils d'utilisation.

1-Préparer votre pulvérisateur pour utilisation

Avant d'utiliser ce médicament pour la première fois ou si le flacon n'est pas utilisé quotidiennement, agitez le flacon, après avoir enlevé le capuchon de protection, tenez le flacon en position verticale, placez votre pouce sur le fond du flacon et vos doigts des deux côtés de la tête du pulvérisateur et pompez dans l'air en le tournant loin de vous jusqu'à obtention d'une brume uniforme (voir figure en face).



Si le pulvérisateur n'a pas fonctionné n'essayez pas de débloquer l'applicateur nasal en insérant une aiguille ou un autre objet pointu reportez-vous à la section «Nettoyage de votre pulvérisateur».

2-Utilisation de votre pulvérisateur

Lors de chaque utilisation :

- Mouchez-vous soigneusement pour assécher le nez avant chaque prise.
Agitez doucement le flacon.
Enlevez le capuchon anti poussière.
- Placez votre pouce sur le fond du flacon et les doigts de chaque côté de l'embout tout en maintenant le flacon en position verticale.
- Couvrez l'une de vos narines avec votre doigt, insérez l'extrémité de l'embout dans l'autre narine (voir figure en face).
- Inclinez légèrement la tête pour maintenir le flacon en position verticale. Commencez à respirer par le nez et appuyez avec les doigts. Gardez l'embout de pulvérisation dans la narine en expirant par la bouche (voir figure en face) répétez selon le nombre de pulvérisations prescrites.
- Retirez l'embout de cette narine et répétez les étapes 3 et 4 pour la deuxième narine.
- Essuyez l'embout avec un tissu propre et replacez le capuchon anti poussière.



3-Nettoyage de votre pulvérisateur :

Nettoyez régulièrement la partie supérieure en plastique. Pour cela, enlevez le capuchon anti poussière et la bague de protection puis tirez vers le haut pour retirer l'embout de pulvérisation. Lavez les parties en plastique à l'eau chaude du robinet et laissez les sécher complètement avant de les remettre en place.

Si l'embout est bouché, vous pouvez le retirer et le laisser dans de l'eau tiède. Puis rincez, séchez et replacez-le.

Administration chez les enfants : Un adulte devrait aider les enfants à utiliser ce médicament.

Contre – indications :

N'utilisez jamais FLUTEL® dans les cas suivants :

- Si vous êtes allergique à la substance active ou à l'un des autres composants contenus dans ce médicament, mentionnés dans la rubrique « excipients »,
- Si vous présentez des troubles de la coagulation sanguine (notamment des saignements de nez),
- Si vous avez de l'herpès au niveau des muqueuses du nez, des lèvres, de la bouche ou des yeux,
- Si votre enfant est âgé de moins de 4 ans.

EN CAS DE DOUTE, IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE FLUTEL®.

Précautions d'emploi et mises en garde spéciales :

ADRESSEZ-VOUS A VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN AVANT D'UTILISER FLUTEL®.

Précautions d'emploi

- L'efficacité maximale de ce médicament ne se manifeste qu'au bout de quelques jours et dépend du respect rigoureux de la posologie.
- Pour que ce médicament soit actif, les fosses nasales doivent être libres. Par conséquent, mouchez-vous avant l'utilisation de ce produit.
- Si la sensation de nez bouché persiste malgré la mise en route du traitement, consultez votre médecin afin qu'il réévalue le traitement.
- En cas de traitement prolongé, vous devrez vous rendre chez votre médecin afin qu'il réalise un examen ORL détaillé de votre muqueuse nasale.

Mises en gardes spéciales

- Si vous présentez une surinfection (mouchage purulent), de la fièvre ou une infection broncho-pulmonaire, prévenez votre médecin.
- Si vous avez subi récemment une intervention chirurgicale ou un traumatisme au niveau du

nez, tant que la guérison n'est pas complète, n'utilisez pas ce produit.

- Prendre des corticoïdes par voie nasale (comme FLUTEL®) peut, lorsqu'ils sont pris pendant longtemps et/ou à fortes doses :

- ralentir la croissance chez l'enfant. Votre médecin mesurera régulièrement la taille de votre enfant, et s'assurera que celui-ci prend la dose efficace la plus faible.

- entraîner des troubles oculaires comme un glaucome (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil) ou une cataracte (voile au niveau du cristallin de l'œil). Informez votre médecin si vous avez déjà eu de tels troubles ou si vous remarquez un changement de votre vision au cours d'un traitement par FLUTEL®.

Contactez votre médecin en cas de vision floue ou d'autres troubles visuels.

- FLUTEL® 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale contient du sorbate de potassium

Le sorbate de potassium peut provoquer des réactions cutanées locales.

Sportifs :

Attention ce médicament contient un principe actif pouvant rendre positifs les tests pratiqués lors de contrôles antidopage.

Enfants

Sans objet.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HESITER A DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MEDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

Interactions médicamenteuses :

VEUILLEZ INFORMER VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN SI VOUS PRENEZ OU AVEZ PRIS RECEMMENT UN AUTRE MEDICAMENT AVEC OU SANS ORDONNANCE.

Informez votre médecin en particulier si vous prenez déjà :

- Certains médicaments à base de kétoconazole (médicaments qui agissent contre les champignons),
- Certains médicaments peuvent augmenter les effets indésirables du propionate de fluticasone et il est possible que votre médecin souhaite vous surveiller attentivement si vous prenez ces médicaments (y compris certains médicaments pour traiter l'infection à VIH : ritonavir, cobicistat).

Interactions avec les aliments, boissons et de l'alcool

Sans objet.

Grossesse et allaitement :

Si vous êtes enceinte ou que vous allaitez, si vous pensez être enceinte ou planifiez une grossesse, demandez conseil à votre médecin ou pharmacien avant de prendre ce médicament.

Ce médicament ne sera utilisé pendant la grossesse que sur les conseils de votre médecin.

Si vous découvrez que vous êtes enceinte pendant le traitement, consultez votre médecin car lui seul peut juger s'il est nécessaire de poursuivre le traitement.

Conducteurs et utilisateurs de machines :

Il est peu probable que ce médicament ait des effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines.

DEMANDEZ CONSEIL A VOTRE MEDECIN OU A VOTRE PHARMACIEN AVANT DE PRENDRE TOUT MEDICAMENT.

Effets indésirables :

Comme tous les médicaments, ce médicament peut provoquer des effets indésirables, mais ils ne surviennent pas systématiquement chez tout le monde.

Il peut survenir :

- des saignements de nez, une irritation de la gorge ou une sensation de brûlure nasale pouvant entraîner des étournements, une sécheresse de la muqueuse du nez, des maux de tête ainsi qu'un goût et une odeur désagréables.

En cas de persistance d'une irritation nasale, **consultez votre médecin.**

- des réactions allergiques telles que des manifestations cutanées, des gonflements du visage ou de la gorge ; ces manifestations peuvent exceptionnellement être généralisées.

Consultez alors votre médecin.

- parfois une mycose nasale (affection due au développement de certains champignons microscopiques). Dans ce cas, **arrêtez le traitement et consultez votre médecin afin qu'il envisage un traitement adapté.**

- très rarement : possibilité de glaucome (augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil), cataracte (opacification du cristallin de l'œil).

En cas de vision floue, de douleur ou d'autres troubles visuels, **consultez votre médecin.**

- avec une fréquence indéterminée :

- ulcérations dans le nez
- vision floue

Déclaration des effets secondaires

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via le système national de déclaration : Centre National de pharmacovigilance et de matériovigilance

-Site internet : www.cnpm.org.dz

-Adresse : CNPM, sis,route petit staouali (NIPA) dely Ibrahim –Alger 16320

-Tel/Fax : (213)23367502 / (213)23367527 / (213)23367529

-Email : cnpm@cnpm.org.dz

En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament.

Surdosage :

Si vous avez pris plus de FLUTEL® 50 microgrammes/dose, suspension pour pulvérisation nasale que vous n'auriez dû :

Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous avez utilisé accidentellement plus que ce qui vous a été prescrit, un surdosage pourra avoir des effets néfastes.

Dans tous les cas, il faut se conformer à l'ordonnance de votre médecin et ne pas augmenter ou diminuer la dose sans l'avis de votre médecin ou de votre pharmacien.

Si vous oubliez de prendre FLUTEL® 50 microgrammes/ dose, suspension pour pulvérisation nasale :

Prenez votre dose suivante à l'heure habituelle.

Ne prenez pas de double dose pour compenser la dose que vous avez oubliée de prendre.

Si vous arrêtez de prendre FLUTEL® 50 microgrammes/ dose, suspension pour pulvérisation nasale :

Sans objet.

ADRESSEZ-VOUS À VOTRE MEDECIN OU PHARMACIEN SI VOUS AVEZ D'AUTRES QUESTIONS SUR L'UTILISATION DE CE MEDICAMENT.

Précautions particulières de conservation :

Tenir ce médicament hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver à une température ambiante en dessous de 25°C et dans son emballage d'origine. Ne pas congeler.

Nature et contenu :

Flacon en verre ambré type III de 15 ml contenant 120 pulvérisations. Fourni avec une pompe doseuse, conditionnés dans une boîte en carton avec notice.

Conditions de délivrance :

Liste 1



Nom et adresse du titulaire et l'exploitant de la décision d'enregistrement :

Sarl World Medecine Limited

Zone industriel Oued Tlilat N°08 ,07 ,09, Ilot 08, Commune Oued Tlilat, Wilaya d'Oran, Algérie

Nom et adresse des participants dans la fabrication en gros , conditionnement primaire et secondaire et libération des lots :

Sarl World Medecine Limited

Site de production 2, Zone industriel Oued Tlilat N°08 ,07 ,09, Ilot 08, Commune Oued Tlilat, Wilaya d'Oran, Algérie

D.E.n°: 23/22 E 027/544

Date de révision de la notice : Novembre 2023

فلوتال®

بروبيونات الفلوتيكازون

معلق للرش في الأنف

التركيب

المادة الفعالة:

بروبيونات الفلوتيكازون.....50 ميكروغرام للجرعة الواحدة.

السواغات:

ميكروكريستاين السيليلوز / كارميلوز الصوديوم، جلوكوز (لا مائي)، كحول فينيل إيثيلي، إديتات ثنائي الصوديوم، بولي صوريات 80، صوريات البوتاسيوم، حمض الكلوريدريك (مركز)، هيدروكسيد الصوديوم وماء منقى.

سواغ ذو أثر معلوم: صوريات البوتاسيوم.
يحتوي **فلوتال®** على الصوديوم والجلوكوز. لا يتوقع حدوث آثار جانبية فيما يتعلق بمسار استخدام الدواء.

دواعي الاستعمال العلاجية:

Code ATC : R01AD08

يحتوي هذا الدواء على كورتيكوستيرويد (مشتق من الكورتيزون).

إنه علاج مضاد للالتهابات يتم إعطائه عن طريق الأنف. يوصف:

- للشخص البالغ والطفل الذي يزيد عمره عن 12 سنة، لعلاج التهاب الأنف التحسسي، للطفل الذي عمره من 4 إلى 12 سنة، لعلاج التهاب الأنف التحسسي الموسمي فقط (حمى القش)،
- للشخص البالغ، للتخفيف من الأعراض المتعلقة بوجود الاورام الحميدة (أورام بدون خطورة تتطور على الأغشية المخاطية) في الأنف.

مقادير الاستعمال:

استخدم هذا الدواء تمامًا كما أخبرك طبيبك. في حالة الشك، اطلب رأي طبيبك أو الصيدلاني. لا تقم بزيادة الجرعة أو عدد مرات أو مدة الاستعمال التي وصفها طبيبك.

التهاب الأنف التحسسي:

• **الاستخدام لدى الأطفال ما بين 4 و12 سنة (علاج التهاب الأنف التحسسي الموسمي فقط):**

الجرعة الموصى بها هي 100 ميكروغرام في اليوم، أو بحّة واحدة في كل فتحة أنف مرة واحدة في اليوم في الصباح.

لا تتعدى بحّة واحدة في كل فتحة أنف، صباحًا ومساءً.

- يعتمد بدء العلاج ومدته على التعرض للمادة المسببة للحساسية.

• **الاستخدام لدى البالغين والأطفال بعمر 13 سنة فما فوق:**

الجرعة الموصى بها هي 200 ميكروغرام في اليوم، أو بحّتان (2) في كل فتحة أنف مرة واحدة في اليوم، في الصباح.

لا تتجاوز بحّتين في كل فتحة أنف، صباحًا ومساءً.

- يعتمد بدء العلاج ومدته على التعرض للمادة المسببة للحساسية.

• **وجود الاورام الحميدة في الأنف (داء السلائل الأنفية):**

• **العلاج الأول:** 400 ميكروغرام في اليوم، أو بحّتان (2) في كل فتحة أنف مرتين في اليوم، صباحًا ومساءً.

• **علاج المداومة** (العلاج المنتظم): بمجرد السيطرة على الأعراض، (بشكل عام، بعد شهر إلى شهرين)، 200 ميكروغرام في اليوم، أو بحّتين (2) في كل فتحة أنف، مرة واحدة في الصباح.

- في جميع الحالات، يُصح بالسعي دائمًا للحصول على أقل جرعة فعالة.

- في حالة استمرار الاضطرابات، لا تقم بزيادة الجرعة، ولكن استشر طبيبك.

كيفية الاستعمال:

فقط عن طريق الأنف.

لا يتعلق.

اتبع تعليمات الاستخدام بعناية.

1-تحضير البخاخ للاستخدام

قبل استخدام هذا الدواء لأول مرة أو إذا لم يتم استخدامه يوميًا، قم برّج القارورة، بعد إزالة غطاء الحماية، أمسك القارورة في وضع مستقيم، ضع إبهامك على الجزء السفلي من الزجاجة وأصابعك على جانبي رأس البخاخ وضّح مع توجيهه بعيدًا عنك أو أن يتم الحصول على ضباب منتظم (انظر الشكل المقابل).

إذا لم يعمل البخاخ، لا تحاول فتحه عن طريق إدخال إبرة أو أي شيء حاد آخر ارجع الى قسم «تنظيف البخاخ».

2- استخدام البخاخ

عند كل استخدام:

1. نظف أنفك بعناية حتى يكون جافًا قبل كل استخدام.

رجّ القارورة برفق.

قم بإزالة الغطاء الواقي من الغبار.

2. ضع إبهامك على الجزء السفلي من القارورة وأصابعك على جانبي الفوهة مع ابقاء القارورة في وضع عمودي.

3. قم بتغطية إحدى فتحتي أنفك بإصبعك، وأدخل نهاية الفوهة في فتحة الأنف الأخرى (انظر الشكل المقابل).

4. قم بإمالة رأسك قليلاً للحفاظ على القارورة في وضع عمودي. ابدأ في التنفس من أنفك واضغط بأصابعك. احتفظ بفوهة البخاخ في فتحة الأنف أثناء الزفير من فمك (انظر الشكل المقابل) كرر حسب عدد البخاخات الموصوفة لك.

5. قم بإزالة فوهة البخاخ من فتحة الأنف وكرر الخطوتين 3 و4 لفتحة الأنف الثانية.

6. امسح الفوهة بقطعة قماش نظيفة وأعد وضع الغطاء الواقي من الغبار.

3-تنظيف البخاخ:

قم بتنظيف الجزء البلاستيكي العلوي بانتظام. للقيام بذلك، قم بإزالة الغطاء الواقي من الغبار، ثم اسحب لأعلى لإزالة فوهة البخاخ. اغسل الأجزاء البلاستيكية بماء الصنبور الساخن واتركها تجف تمامًا قبل إعادة تركيبها مرة أخرى.

في حالة انسداد الفوهة، يمكنك إزالتها وتركها في ماء فاتر، ثم اشطفها وجففها وأعدّها إلى مكانها.

الاستخدام عند الأطفال: يجب على الشخص البالغ مساعدة الأطفال على استخدام هذا الدواء.

موانع الاستعمال:

يمنع استخدام فلوتال® مطلقًا في الحالات التالية:

• إذا كنت تعاني من حساسية تجاه المادة الفعالة أو أي من المكونات الأخرى لهذا الدواء، المذكورة في قسم «السواغات»،

• إذا كنت تعاني من اضطرابات تخثر الدم (خاصة نزيف الأنف)،

• إذا كنت مصابًا بالهريس على الأغشية المخاطية للأنف أو الشفتين أو الفم أو العينين،

• إذا كان طفلك يبلغ أقل من 4 سنوات.

في حالة الشك من الضروري استشارة طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ فلوتال®.

احتياطات الاستخدام وتحذيرات خاصة:

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل استخدام فلوتال®.

احتياطات الاستخدام

• لا تظهر الفعاليّة القصوى لهذا الدواء إلا بعد أيام قليلة ويعتمد ذلك على التقيد الصارم بالجرعات الموصوفة.

• لكي يكون هذا الدواء فعالًا، يجب أن تكون الممرات الأنفية فارغة.

لذلك، قم بتنظيف أنفك قبل استخدام هذا الدواء.

• في حال استمرار الشعور بانسداد الأنف على الرغم من بدء العلاج، استشر طبيبك لإعادة تقييم العلاج.

• في حالة العلاج لفترة طويلة، سوف تحتاج إلى الذهاب إلى طبيبك حتى يقوم بإجراء فحص مفضل للأنف والأذن والحنجرة للغشاء المخاطي للأنف.

تحذيرات خاصة

• إذا كنت تعاني من عدوى شديدة (مخاط متقيح) أو حمى أو عدوى في القصبات الرئوية، أخبر طبيبك.

• إذا كنت قد خضعت مؤخرًا لعملية جراحية أو تعرضت لصدمة في أنفك، لا تستخدم هذا الدواء حتى اكتمال الشفاء.

• يمكن أن يؤدي استخدام الكورتيكوستيرويدات عن طريق الأنف (على غرار فلوتال®)، عند استخدامه لفترة طويلة و/أو بجرعات عالية، إلى:

- بطء النمو عند الأطفال. سيفوق طبيبك بقياس طول طفلك بانتظام والتأكد من أن طفلك يأخذ أقل جرعة فعالة.

50 ميكروغرام / جرعة

- تسبب اضطرابات في العين مثل الجلوكوما (زيادة الضغط داخل العين) أو عتامة العين (حجاب على مستوى عدسة العين).

أخبر طبيبك إذا كنت قد عانيت في أي وقت مضى من مثل هذه الاضطرابات أو إذا لاحظت أي تغيير في رؤيتك أثناء العلاج ب فلوتال®.

• **اتصل بطبيبك إذا كنت تعاني من عدم وضوح الرؤية أو اضطرابات بصرية أخرى.**

• **يحتوي فلوتال® 50 ميكروغرام / للجرعة، معلق للرش في الأنف، على صوريات البوتاسيوم.**

يمكن أن يسبب صوريات البوتاسيوم ردود فعل جلدية موضعية.

الرياضيون:

حذر، يحتوي هذا الدواء على مادة فعالة يمكن أن تؤدي إلى نتيجة إيجابية للاختبارات التي تجري لضبط تناول المنشطات.

الأطفال

لا ينطبق.

في حالة الشك، لا تتردد في طلب نصيحة طبيبك أو الصيدلاني.

التداخلات الدوائية:

الرجاء إبلاغ طبيبك أو الصيدلاني إذا كنت تأخذ أو قد أخذت مؤخرًا أي أدوية أخرى مع أو دون وصفة طبية.

أخبر طبيبك بشكل خاص إذا كنت تأخذ:

• بعض أدوية الكيتوكونازول (الأدوية المضادة للفطريات)،

• يمكن لبعض الأدوية أن تزيد من الآثار الجانبية لبروبيونات الفلوتيكازون وقد يرغب طبيبك في مراقبتك بعناية إذا كنت تأخذ هذه الأدوية (بما في ذلك بعض الأدوية لعلاج عدوى فيروس نقص المناعة البشرية: ريتونافير، كوبيسيستات).

التفاعلات مع الطعام والشراب والكحول

لا ينطبق.

الاستخدام أثناء الحمل والرضاعة:

إذا كنت حاملًا أو مرضعة، تحتفظين أنك حامل أو تخططين لإنجاب طفل، استشري طبيبك أو الصيدلاني قبل استخدام هذا الدواء.

يمنع استخدام هذا الدواء أثناء الحمل إلا بناءً على نصائح طبيبك.

إذا اكتشفت أنك حامل أثناء العلاج، فاستشري طبيبك لأنه وحده يستطيع تحديد ما إذا كان من الضروري مواصلة العلاج.

السائقون ومستعملو الآلات:

من غير المحتمل أن يؤثر هذا الدواء على قدرتك على السياقة أو استخدام الآلات.

استشر طبيبك أو الصيدلاني قبل أخذ أي دواء.

الأعراض الجانبية:

على غرار جميع الأدوية، يمكن أن يسبب هذا الدواء آثارًا جانبية، على الرغم من عدم حدوثها لدى الجميع.

يمكن حدوث:

• نزيف في الأنف، تهيج في الحنجرة أو إحساس بحرقان في الأنف مما قد يؤدي إلى العطس وجفاف غشاء الأنف والصداغ وطعم ورائحة كريهة.

• إذا استمر تهيج الأنف، **استشر طبيبك.**

• ردود فعل حساسية على غرار الأعراض الجلدية، انتفاخ في الوجه أو الحنجرة يمكن تعميم هذه الأعراض بشكل استثنائي. **استشر طبيبك.**

• عدوى فطرية أنفية في بعض الأحيان (حالة ناتجة عن تطور بعض الفطريات المجهريّة). في هذه الحالة، **توقف عن العلاج واستشر طبيبك حتى يتمكن من التفكير في العلاج المناسب.**

• نادرا جدا: احتمالية حدوث الجلوكوما (زيادة الضغط داخل العين)، عتامة العين (غشاوة على مستوى عدسة العين).

إذا كنت تعاني من عدم وضوح الرؤية أو الألم أو اضطرابات بصرية أخرى، **فاستشر طبيبك.**

• يتردد غير محدد:

- تقرحات بالأنف

- عدم وضوح الرؤية

التبليغ عن الأعراض الجانبية

إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية، تحدث إلى طبيبك أو الصيدلاني. ينطبق هذا أيضًا على أي آثار جانبية غير مذكورة في النشرة. يمكنك أيضًا الإبلاغ عن الأعراض مباشرة عبر نظام الإبلاغ الوطني: المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي.

- الموقع: www.cnpm.org.dz

العنوان: المركز الوطني لليقظة بخصوص الأدوية والعتاد الطبي سطاوالي الصغرى معهد باستور دالي براهم الجزائر 16320.

هاتف / فاكس: 23367502 (213) / 23367527 (213) / 23367529 (213)

- البريد الإلكتروني: cnpm@cnpm.org.dz

من خلال الإبلاغ عن الآثار الجانبية، يمكنك المشاركة في توفير مزيد من المعلومات حول سلامة هذا الدواء.

فرط في الجرعة:

في حالة استخدام كمية أكثر من اللازم من فلوتال® 50 ميكروغرام / للجرعة، معلق للرش في الأنف:

أخبر طبيبك أو الصيدلاني إذا استخدمت بالخطأ أكثر مما تم وصفه، فقد يكون للجرعة الزائدة آثار ضارة.

في جميع الحالات، اتبع وصفة طبيبك ولا تزيد أو تنقص الجرعة دون استشارة طبيبك أو الصيدلاني.

في حال نسيان أخذ فلوتال® 50 ميكروغرام / للجرعة، معلق للرش في الأنف:

خذ جرعتك التالية في الوقت المعتاد.

لا تأخذ جرعة مضاعفة لتعويض الجرعة التي نسيت أخذها.

في حال التوقف عن استخدام فلوتال® 50 ميكروغرام / للجرعة، معلق للرش في الأنف:

لا ينطبق.

اسأل طبيبك أو الصيدلاني إذا كان لديك المزيد من الأسئلة حول استخدام هذا الدواء. الاحتياطات الخاصة بالحفظ:

يحفظ هذا الدواء بعيدا عن نظر الأطفال ومتناولهم.

يحفظ في درجة حرارة الغرفة أقل من 25 درجة مئوية وفي عبوته الأصلية.

لا يجمد.

الشكل الصيدلاني والمحتوى:

عبوة ذات سعة 15 ملل من الزجاج الكهرماني صنف III تحتوي على 120 جرعة، مزودة ببخاخ للأنف و غطاء واقي من الغبار، معبأة في علبة مع ششرة.

شروط الصرف:

القائمة ا



اسم و عنوان حائز و مستغل مقرر التسجيل:

ش.ذ.م.م وورد ميدسين ليميتاد

منطقة الصناعات وادي تليبات رقم 08, 07 و 09, جزء رقم 08, بلدية وادي تليبات، ولاية وهران، الجزائر

اسم و عنوان المتدخلين في صناعة الجملة و التوزيع الاولي و الثانوي و المتدخلين في تحرير الحصص:

ش.ذ.م.م وورد ميدسين ليميتاد

موقع الانتاج 2, منطقة الصناعات وادي تليبات رقم 08, 07 و 09, جزء رقم 08, بلدية وادي تليبات، ولاية وهران، الجزائر

رقم مقرر التسجيل: 23/22 E 027/544

تاريخ مراجعة النشرة: نوفمبر 2023