LIMENDA®

Ovules vaginaux LIMENDA®
Il est administré par voie vaginale.
• **Substances actives:** chaque ovule contient 750 mg de métronidazole, 200 mg de nitrate de miconazole
• **Excipients:**Witepsol

Veuillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament, elle contient des informations spéciales pour vous.
• Gardez cette notice. vous aurez peut-être besoin de la relire.
• Si vous avez d'autres questions, interrogez votre médecin ou votre pharmacien.
• Ce médicament vous a été personnellement prescrit, ne le transmettez pas à autrui.
• Si vous vous rendez chez un médecin ou à l'hôpital au moment d'utiliser ce médicament, veuillez en informer votre médecin.
• Veuillez suivre exactement les instructions. N'utilisez pas d'autres doses élevées ou faibles hors des recommandations.

Dans cette Notice :

1. Qu'est-ce que **LIMENDA®** et à quoi sert-il?
2. Avant de prendre **LIMENDA®**
3. Comment prendre **LIMENDA®** ?
4. Quels sont les effets secondaires possibles?
5. Comment conserver **LIMENDA®** ?

1. Qu'est-ce que LIMENDA® et dans quel cas est-il utilisé?
• **LIMENDA®** est un médicament sous forme d'ovule qui est administré par voie vaginale.
Il fait parti d'un groupe de médicaments nommés antibactériens (efficaces contre les bactéries), antiprotozoaires (efficaces contre les parasites), antifongiques (efficaces contre les champignons).
• Chaque ovule ellipsoïde de couleur blanc jaunâtre contient 750 mg de métronidazole et 200 mg de nitrate de miconazole comme substance active. **LIMENDA®** est présenté dans un étui comprenant 7 ovules et 7 doigtiers ,ces derniers sont utilisés lors de l'administration de l'ovule dans le vagin.
• **LIMENDA®** est indiqué dans le traitement de l'inflammation vaginale (vaginite) qui est accompagné de démangeaisons, de brûlures, de sécretions vaginales anormales, de gonflements et d'éruptions vaginales.

2-Avant de prendre LIMENDA®
Ne prenez pas **LIMENDA®** dans les conditions suivantes;
Si,
• vous êtes allergique à l'une des substances actives ou à l'un de leurs dérivés entrant dans la composition de **LIMENDA®**,
• Vous êtes dans les 3 premiers mois de votre grossesse,
• Vous souffrez de porphyrie (maladie métabolique héréditaire),
• Vous souffrez d'épilepsie,
• Vous souffrez d'un dysfonctionnement hépatite aigu.
Ne pas consommer d'alcool durant le traitement par **LIMENDA®**, et pendant les 3 jours suivant la fin du traitement.

Les médicaments utilisés dans le traitement de la dépendance à l'alcool et dont la substance active est le Disulfirame ne doivent pas être utilisés durant le traitement, et même deux semaines après la fin du traitement par **LIMENDA®**.

Faites attention avec LIMENDA® dans les conditions suivantes;
• **LIMENDA®** peut endommager le caoutchouc. De ce fait, évitez le contact des ovules avec des préservatifs et des diaphragmes contraceptifs. Sinon, des grossesses indésirables peuvent survenir.
• Dans certains cas votre partenaire devra être traité avec un médicament oral approprié (dans ce cas veuillez être très attentif au traitement qui vous est administré ou à votre partenaire).
• Lorsque le traitement par **LIMENDA®** est utilisé durant une longue periode ou a des doses plus élevées que celles recommandés par votre médecin, des sensation de faiblesse dans les bras ou les jambes peuvent survenir ainsi que des douleurs des picotements (Symptômes de neuropathie périphérique),et des convulsions , dans cette situation ,il faut arrêter le traitement immédiatement et consultez votre médecin ou un hôpital.
• N'utilisez pas d'autres produits vaginaux (tels que des tampons, ou des spermicides) pendant le traitement par **LIMENDA®**.

LIMENDA® ne doit pas être utilisé chez les filles n'ayant pas atteint la maturité sexuelle et les vierges.

Si l'un de ces avertissements s'applique à vous, ou vous est déjà arrivé dans le passé, veuillez consulter votre médecin.

Prendre LIMENDA® avec de la nourriture et des boissons
LIMENDA® est un traitement administré par voie vaginale et par conséquent n'a aucune interaction avec les aliments ou les boissons.

Grossesse
Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.
Si vous êtes enceinte, seul votre médecin peut décider si vous utiliserez **LIMENDA®** ou non.
Consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien si vous vous rendez compte que vous êtes enceinte durant le traitement.
Allaitement :
Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre ce médicament.
Le métronidazole, qui est l'une des substances actives de **LIMENDA®**, passe dans le lait maternel. Pour cette raison, le bébé doit être sevré avant le traitement, l'allaitement peut être poursuivi 24 à 48 heures plus tard après la fin du traitement.

Conduite et utilisation de machines
LIMENDA® n'a aucun effet sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines, lorsqu'il est utilisé à la dose et au temps indiqués par votre médecin. Mais si vous ressentez des effets secondaires tels que des étourdissements, de la fatigue, de l'apathie, n'utilisez pas de véhicule à moteur ou de machine.

Informations importantes sur certains excipients dans le contenu de LIMENDA®
Aucun excipient ne nécessite un avertissement spécial dans le contenu **LIMENDA®**.

Prise avec d'autres médicaments
Si vous prenez de l'alcool ou l'un des médicaments suivants, Informez votre médecin ou votre pharmacien immédiatement.
• Médicaments empêchant la coagulation du sang (tels que les médicaments comprenant l'acénocumarol, l'anisindione, le dicumarol, la phénindione, le phénprocoumon et la warfarine en tant que substance active).
• Médicaments utilisés pour traiter les ulcères gastriques et duodénaux et contenant des substances appelées cimétidine et cisapride comme substance active.
• Médicaments utilisés dans le traitement des maladies allergiques (tels que les médicaments comprenant l'astémizole et la terfénadine en tant que substance active).
• Médicaments supprimant le système immunitaire et contenant une substance appelée cyclosporine comme substance active.
• médicaments utilisés dans le traitement de la maladie du diabète et contenant du glimépiride comme substance active.
• Médicaments utilisés dans le traitement de problèmes tels que l'incontinence urinaire, la thamurie et les fuites urinaires (tels que les médicaments comprenant l'oxybutynine et la tolterodine en tant que substance active).
Médicaments utilisés dans le traitement des troubles psychologiques, contenant une substance appelée Pimozide comme substance active.
• Médicaments utilisés dans le traitement de la dépendance à l'alcool, contenant le disulfirame comme sustance active.
• Médicaments utilisés dans le traitement du cancer (tels que les médicaments comprenant le fluorouracile et le trimétrexate en tant que substance active).
• Médicaments utilisés dans le traitement de l'épilepsie (tels que les médicaments comprenant la carbamazépine, la fosphénytoïne, le phénobarbital et la phénytoïne en tant que substance active).
• Médicaments utilisés dans le traitement des troubles de l'humeur , contenant le lithium comme substance active.
• Médicaments ayant les caractéristiques des analgésiques narcotiques contenant des substances actives telles que l'oxycodone et le fentanyl qui sont utilisés comme analgésiques pour les douleurs sévères observées en particulier chez les patients cancéreux.
• Médicaments contenant une substance appelée théophylline utilisée pour le traitement de l'asthme.
• Médicaments utilisés dans le traitement de l'arythmie cardiaque et Contenant l'amiodarone et procainamide comme substances actives.
Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez actuellement ou avez récemment pris tout autre médicament, y compris des médicaments avec ou sans ordonnance.

3. Comment prendre LIMENDA®?
Instruction pour une bonne utilisation / fréquence d'application :
Sauf avis contraire de votre médecin, administrez un ovule quotidiennement une fois par jour le soir avant de vous coucher pendant 7 jours. En cas de répétition de la maladie, votre médecin peut vous conseiller d'utiliser 1 ovule pendant 14 jours la nuit (de préférence avant le coucher).
Étant donné que l'effet de **LIMENDA®** peut diminuer et/ou des difficultés d'utilisation peuvent survenir lorsqu'il est administré pendant les menstruations, l'utilisation pendant cette période n'est pas recommandée.

Voie et méthode d'administration:
LIMENDA® n'est utilisé qu'en administration par voie vaginale.
Avant d'administrer le médicament, allongez-vous sur le dos. écartez légèrement vos jambes. Insérez un ovule dans votre vagin en portant le doigtier, poussez le plus possible vers l'avant. Si cela est possible, ne vous levez pas pendant une demi-heure après avoir placé l'ovule.

Suivez les recommandations déterminées par votre médecin.

LIMENDA® ne doit pas être avalé ou utilisé par une autre voie.

Différents groupes d'âge:
Administration chez l'enfant:
LIMENDA® ne doit pas être administré aux enfants de moins de 12 ans.
Administration chez les personnes âgées:
Il n'y a pas de conseil d'utilisation particulier chez les personnes âgées.

Conditions d'utilisation spécifiques:
Insuffisance rénale:
Il n'y a pas de conseil d'utilisation spécial. Si vous êtes une patiente en dialyse, vous devez consulter votre médecin avant de commencer le traitement par **LIMENDA®**.
Insuffisance hépatique:
Si vous avez une insuffisance hépatique, **LIMENDA®** doit être utilisé avec précaution et sous surveillance médicale. La dose de **LIMENDA®** sera ajustée par votre médecin.

• Informez votre médecin ou pharmacien si vous avez une impression que l'effet de **LIMENDA®** est très fort ou très faible.

• Si vous avez pris plus de LIMENDA® que vous n'auriez dû
Si vous avez pris plus de **LIMENDA®** que vous n'auriez dû, consultez un médecin ou un pharmacien.
Lorsque la dose recommandée par votre médecin est dépassée des effets indésirables peuvent survenir, nausées, vomissements, inappétence, douleurs abdominales, diarrhée, démangeaisons, goût métallique dans la bouche, marche déséquilibrée comme ivre (ataxie), maux de tête, étourdissements, convulsions comme les convulsions épileptiques, diminution des globules blancs (leucopénie), un assombrissement de la couleur de l'urine, une sensation de brûlure dans la bouche et la gorge, brûlure, de picotement, de ruissellement et de piqûre des bras et des jambes (paresthésie). Dans ces cas la, ou si **LIMENDA®** est avalé accidentellement consultez immédiatement votre médecin ou l'hôpital.

• Si vous oubliez de prendre LIMENDA®
Ne prenez pas de double dose pour compenser les doses oubliées.

• Effets pouvant survenir à la fin du traitement par LIMENDA®
La vaginite peut rechuter et ses symptômes peuvent réapparaître si le traitement est interrompu avant le temps déterminé. Aucun effet négatif ne devrait se produire après avoir été administré dans les délais recommandé par votre médecin.

• 4. Quels sont les effets secondaires possibles?
Comme tous les médicaments, **LIMENDA®** peut provoquer des effets indésirables chez les personnes hypersensibles a l'un de ses composants .

Si l'un des évènements suivants se produit, arrêtez d'utiliser LIMENDA® et informez IMMÉDIATEMENT votre médecin et rendez-vous au service d'urgence de l'hôpital le plus proche de chez vous:
• Éruption cutanée severe.
• Gonflement du visage, des lèvres, de la langue et de la gorge, difficulté à respirer,
Ce sont tous des effets secondaires très graves.
Si l'un de ces effets survient, cela signifie que vous êtes trop allergique à **LIMENDA®**. Vous pourriez avoir besoin d'un traitement médical urgent ou être hospitalisé.
Tous ces effets secondaires graves sont assez rares.

Informez immédiatement votre médecin ou présentez-vous à l'urgence de l'hôpital si vous remarquez l'une des situations suivantes:
• Convulsions comme les convulsions épileptiques
• Marche déséquilibré (ataxie)
• Changements psychologiques, dépression
• Faiblesse dans les bras ou les jambes, douleur, picotements (symptômes de neuropathie périphérique)
• Diminution du nombre de globules blancs (leucopénie), qui est un symptôme d'infection dans le corps
• Maux de tête, vertiges
• Fatigue ou faiblesse
• Changement de goût, goût métallique en bouche
• Bouche sèche, sensation de soif
• Nausées, vomissements, inappétence
• Douleurs abdominales ou crampes
• Constipation ou diarrhée
La possibilité d'avoir ces effets secondaires à la suite de l'utilisation des ovules est très faible car le taux de passage du métronidazole dans le sang est minime lors de son administration par voie vaginale.

Des effets secondaires graves sont très rarement observés.

• Si vous remarquez l'un effets indésirables suivants, informez votre médecin:
• Brûlure, démangeaisons, irritation, écoulement, éruption cutanée sur la zone d'administration.
• Douleur abdominale.
Ce sont des effets secondaires légers de **LIMENDA®**.

Si vous remarquez un effet indésirable non mentionné dans cette notice, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Comment conserver LIMENDA®?
Gardez **LIMENDA®** hors de la portée et de la vue des enfants et dans son emballage.
Conserver en dessous de 25 ° C à température ambiante.

Utiliser conformément avant la date de péremption.
N'utilisez pas **LIMENDA®** après la date de péremption indiquée sur l'emballage.
Si vous constatez des défauts sur le produit ou l'emballage, n'utilisez pas **LIMENDA®**.

Condition de délivrance :
Liste I
Délivrée sous prescription médicale

DE N°:.....

Détenteur de la DE:
World medicine Ilaç San Ve Tic AS
15 temmuz mahallesi cami yolu caddesi N 50, Gunesli bagcilar, istanbul, turquie.

Fabricant et conditionneur:
World medicine Ilaç San Ve Tic AS
15 temmuz mahallesi cami yolu caddesi N 50, Gunesli bagcilar, istanbul, turquie.

Cette notice d'information patient approuvée le 05/2020

ليماندا®

تحاميل المهبلية ليماندا®
عن طريق المهبل.
• **الموادالفعالة:** تحتوي كل تحميلة على 750 ملغ ميترونيدازول، و200 ملغ نترات الميكونازول.
• **سواغات:** وايتبسول

اقرئي هذه النشرة كاملة وبعناية قبل استخدام هذا الدواء، فهي تتضمن معلومات هامة.
• احتفظي بهذه النشرة فقد تحتاجين لقراءتها مجددا.
• إن كانت لديك أي أسئلة أخرى، الرجاء استشارة طبيبك أو الصيدلي الأقرب اليك.
• لقد تم وصف هذا الدواء لك فلا تقدميه لأشخاص آخرين.
• في حالة زيارتك للطبيب أو المستشفى تزامنا مع مدة استخدامك لهذا الدواء، يرجى إبلاغ طبيبك بذلك.
• الرجاء اتباع التعليمات حرفيا، ولا تتناولي جرعات أزيد او اقل من تلك الموصى بها.

تتضمن هذه النشرة:
10. ما هو **ليماندا®**؟و ما هي دواعي استخدامه؟
02. الاحتياطات الواجبة إتخاذها قبل استخدام **ليماندا®**.
30. كيف تاخدين **ليماندا®** ؟
40. ما هي الاثار الجانبية المحتملة ؟
50. كيفية تخزين **ليماندا®** ؟

1- ما هو ليماندا® ؟و ما هي دواعي استخدامه ؟
• **ليماندا®** عبارة عن دواء على شكل تحميلات يتم استخدامها عن طريق وضعه داخل المهبل. تم ادراجه ضمن فئة **الأدوية** المضادة للجراثيم (فعال ضدالبكتيريا) المضادة للطفيليات (فعال ضدالطفيليات) ومضاد للفطريات (فعال ضد أمراض الفطريات).
• تحتوي كل تحميلة إهليليجية ذات اللون الابيض المصفر على750 ملغ من الميترونيدازول و 200 ملغ من نترات الميكونازول كمادة فعالة. يقدم **ليماندا®** في عبوة تحتوي عل 7 تحميلات و7 قفازات اصبعية يتم الاستعانة بها عند وضع الدواء في المهبل.
• يستخدم **ليماندا®** لعلاج التهابات المهبل المرفوقة بحكة، حروق، إفرازات غير اعتيادية، تورم، هيجان في المهبل.

2. الاحتياطات الواجبة إتخاذها قبل استخدام ليماندا®:
لا تستخدمي ليماندا® إن:
• كنت تعانين من حساسية ضد أي من المواد الفعالة أو المواد المشتقة منها والتي تدخل في تركيب **ليماندا®**.
• كنت في الثلاثة الأشهر الأولى من الحمل.
• كنت تعانين من البرفيرية (مرض ايضي وراثي)،
• كنت تعانين من الصرع،
• كنت تعانين من اضطراب حاد في الكبد.
لا تتناولي الكحول عند استخدامك لدواء **ليماندا®**،وكذا بعد نهاية العلاج لمدة ثلاثة أيام على الأقل.
لا ينبغي تناول الأدوية التي تستخدم في علاج إدمان الكحول والتي تحتوي على مادة تسمى ديسولفرام كمادة فعالة أثناء العلاج **بليماندا®** أو خلال الأسبوعين المواليين للعلاج.

يشترط الحرص الشديد عند استخدام ليماندا® في الحالات التالية:
• قد تضر تحاميل **ليماندا®** بالمطاط ، لهذا السبب، يجب تجنب ملامسة التحاميل للواقي الذكري وأغشية منع الحمل. خلافا لذلك، يمكن وقوع حالات الحمل غير مرغوب فيها.
• في بعض الحالات،قد يحتاج شريكك الى العلاج باستخدام دواء ملاءم عن طريق الفم (في هده الحالة يرجى الانتباه بشكل كبير للعلاج الموصى لك او لشريكك).
• عند استخدام جرعات تفوق تلك التي ينصح بها طبيبك ولمدة طويلة، يمكن الاحساس بالضعف على مستوى الذراعين أو الساقين، وألم، ووخز (أعراض الاعتلال العصبي المحيطي) ونوبات مثل نوبات الصرع. في هذه الحالة، توقفي عن استخدام الدواء واستشيري طبيبك أو المستشفى الأقرب اليك.
• لا تستخدمي منتجات مهبلية أخرى (مثل السدادات أو المبيدات المنوية) أثناء العلاج **بليماندا®**.
لا ينبغي أن يستخدم **ليماندا®** من قبل الفتيات اللواتي لم يبلغن النضج الجنسي والعذارى.
إن انطبقت عليك أي من هذه التحذيرات حتى ولوفي وقت مضى، يرجى استشارة طبيبك.
استخدام ليماندا® مع الطعام والشراب:
لا يتفاعل **ليماندا®** مع الطعام والشراب على الاطلاق نظرا لمسلك استخدام الدواء.

الحمل:
استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء.
إن كنت حاملا، يمكن لطبيبك فقط أن يقرر ما إن كان باستطاعتك استخدام **ليماندا®** أم لا.
استشيري طبيبك أو الصيدلي الاقرب اليك على الفور إن لاحظت أنك حامل خلال فترة العلاج.

الرضاعة:
استشيري طبيبك أو الصيدلي قبل استخدام هذا الدواء.
الميترونيدازول الذي يعد أحد المواد الفعالة **لليماندا®** وينفذ الى حليب الأم، لهذا السبب يجب فطام الطفل قبل فترة العلاج، ويمكن للرضاعة الطبيعية ان تستمر بعد 24-48 ساعة من انتهاء العلاج.

السياقة واستخدام الآلات:
لا تحمل **ليماندا®** أي تأثير على القدرة على القيادة أو تشغيل الاجهزة في حالة استخدامه وفقا للجرعة والوقت الذي ينصح بهما طبيبك. لكن، عند مصادفة آثار جانبية مثل الدوخة والتعب والخمول، فلا تقومي باستخدام العربات الآلية أو الآلات.

معلومات مهمة حول بعض السواغات المتضمنة في تركيب ليماندا®:
لا يوجد أي سواغ يتطلب تحذيرا خاصا في محتوى **ليماندا®**

التداخلات مع أدوية أخرى:
إن كنت تتناولين الكحول أو أي من الأدوية التالية فقومي بإبلاغ طبيبك أو الصيدلي .
• الأدوية التي تمنع تجلط الدم (مثل الأدوية التي تحتوي على اسينوكومارول و انيسيندين و ديكومارول و فينيندايو نوفينوبروكومون و الوارفارين كمواد فعالة)
• الأدوية المستخدمة لعلاج القرحة المعدية وقرحة الاثني عشر والتي تحتوي على السيميتيين و سيزابريد كمواد فعالة.
• الأدوية المستخدمة في علاج أمراض الحساسية (مثل الأدوية التي تحتوي على ا الاستميزول والتيرفينيدين كمواد فعالة)
• الادوية التي تثبط الجهاز المناعي والتي تحتوي على السيكلوسبورين كمادة فعالة
• الأدوية المستخدمة في علاج مرض السكري وتحتوي على غليمبريد كمادة فعالة
• الأدوية المستخدمة في علاج المشاكل المشابهة لسلس البول وتعدد البيلات وتسرب البول (مثل الأدوية التي تحتوي على أوكسي بوتينين وتولتيرودين كمواد فعالة)
• الأدوية المستخدمة في علاج اضطرابات المزاج والتي تحتوي على البيموزيد كمادة فعالة
• الأدوية المستخدمة في علاج إدمان الكحول والتي تحتوي على ديسلفيرام كمادة فعالة
• الأدوية المستخدمة في علاج السرطان (مثل الأدوية التي تحتوي على الفلوروبوراسيل و التريميتريكسيت كمواد فعالة)
• الأدوية المستخدمة في علاج الصرع (مثل الأدوية التي تحتوي على كاربامازيبين، فوسفينيتوين، الفينوباربيتال و الفينيتوين كمواد فعالة)
• الأدوية المستخدمة في علاج اضطرابات المزاج والتي تحتوي على مادة تسمى الليثيوم كمادة فعالة.
• الأدوية التي لها خصائص المسكنات المخدرة والتي تحتوي على مواد فعالة مشابهة ل الأوكسيكودون والفنتانيل والتي تستخدم كمسكن للألم في حالات الآلام الشديدة التي تصيب خاصة مرضى السرطان.
• الأدوية التي تحتوي على مادة تسمى الثيوفيلين والمستعملة في علاج الربو
• الأدوية المستعملة في علاج اضطراب ضربات القلب والتي تحتوي على الاميودارون و بروكايينااميد كمواد فعالة.
يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي إن كنت تستخدمين حاليا، أو كنت قد استعملتِ أي أدوية أخرى بما في ذلك الأدوية ب /بدون وصفة طبية.

3- كيف تاخدين ليماندا® ؟
تعليمات الاستخدام السليم:
ما لم ينصحك طبيبك بخلاف ذلك، فقومي باستخدام تحميلة واحدة مرة واحدة يوميًا في الليل قبل النوم لمدة 7 أيام خلال بداية العلاج. في حالة اعادة الاصابة بالمرض، قد ينصحك طبيبك باستخدام تحميلة واحدة لمدة 14 يومًا في الليل (ويفضل استخدامها قبل النوم).
لا ينصح باستخدام **ليماندا®** خلال فترة الحيض نظرا لاحتمال تضاؤل تأثير الدواء، أو مواجهة صعوبات في استخدامه.

مسلك وطريقة الاستخدام:
يستعمل **ليماندا®** عن طريق المهبل فقط.
قبل استخدام الدواء استلقي على ظهرك، افردي ساقيك قليلا ثم ادخلي تحميلة واحدة في مهبلك مع استعمال القفازات الاصبعية ، وادفعيها للأمام قدر الإمكان. إن كان ذلك ممكنًا، فلا تقومي بالوقوف الا بعد مرور نصف ساعة من وضع التحاميل.
احترمي مواقيت العلاج التي يحددها طبيبك.
لا ينبغي ابتلاع **ليماندا®** أو استخدامها عبر مسلك اخر.

الفئات العمرية المختلفة:
كيفية الاستخدام لدى الأطفال:
لا ينصح باستخدام هذا الدواء للأطفال الذين يقل سنهم عن اثنتي عشرة سنة

كيفية الاستخدام لدى كبار السن:
لا توجد توصيات خاصة لاستخدام الدواء من طرف المسنات.

• حالات استخدام خاصة:
القصور الكلوي:
لا توجد أي نصيحة خاصة متعلقة باستخدام الدواء، إن كنت تخضعين لعملية غسيل الكلى، فعليك استشارة طبيبك قبل البدء في العلاج **ليماندا®**.
القصور الكبدي:
إن كنت تعانين من قصور كبدي، فيجب استخدام **ليماندا®**بحذر وتحت الرقابة الطبية، و سيتم تعديل جرعة **ليماندا®** من قبل طبيبك.
أبلغي طبيبك أو الصيدلي الاقرب اليك إن كان لديك انطباع بأن تأثيرليماندا®قوي جدًا أو ضعيف جدًا.

إن كنت تستخدمين ليماندا® أكثر مما ينبغي
إن كنت تستخدمين **ليماندا®** أكثر مما يجب، فتقومي باستشارة الطبيب أو الصيدلي بذلك الشأن.
في حالة تجاوز الجرعة التي ينصح بها طبيبك فقد تظهر عليك أعراض مثل الغثيان، والتقيؤ، وفقدان الشهية، وآلام البطن، والإسهال، والحكة، وطعم المعدن في الفم، والمشي غير المتوازن كالثمل (الترنح)، والصداع، والدوخة، ونوبات مثل نوبات الصرع، انخفاض عدد كريات الدم البيضاء، اسوداد لون البول، و إحساس بالحرقة في الفم والحلق، وحروق، ووخز، والشعور بالنخز في الذراعين والساقين (التنمل). عند وقوع حالة مماثلة لهذه أو في حالة ابتلاع **ليماندا®** عن طريق الخطأ، فقومي باستشارة طبيبك أو الذهاب الى المستشفى على الفور.

إن نسيتي أن تأخذي ليماندا®
لا تستخدمي جرعة مضاعفة للتعويض عن الجرعات التي تخطيتها.

الآثار التي قد تحدث عند انتهاء فترة العلاج بليماندا®
من المحتمل أن يتجدد التهاب المهبل، ويمكن أن تظهر أعراض التهاب المهبل مجددا إن تم إنهاء العلاج قبل وقته المحدد. ليس من المتوقع أن يحدث أي تأثير سلبي في حالة استخدامه وفقا للأوقات التي يحددها طبيبك.

4. ما هي الاثار الجانبية المحتملة ؟
ككل الأدوية يخلف **ليماندا®** آثارًا جانبية لدى الأشخاص ذوي الحساسية المفرطة اتجاه المواد التي تدخل في تركيبه.

في حالة حدوث أي من الحالات التالية، توقفي عن استخدام ليماندا® وأبلغي طبيبك على الفور واتصلي بمصلحة الاستعجالات الخاصة بالمستشفى الاقرب إليك:
• طفح جلدي حاد
• تورم في الوجه والشفتين واللسان والحلق، وصعوبة في التنفس،
وكلها آثار جانبية شديدة الخطورة.
إن ظهرت لديك أي منها فهذا يعني أنك تعاني من حساسية شديدة ضد ليماندا®وقد تحتاج إلى علاج طبي عاجل أو إلى المكوث في المستشفى.
تم رصد هذه الآثار الجانبية الحادة لدى حالات نادرة جدا.

إن لاحظتي أيا مما يلي، فقومي بإخبار طبيبك على الفور أو توجهي إلى مصلحة الاستعجالات بالمستشفى:
• نوبات مثل نوبات الصرع
• المشي غير المتوازن كالثمل (ترنح)
• التغيرات النفسية والاكتئاب
• ضعف الذراعين أو الساقين، وألم، ووخز (أعراض الاعتلال العصبي المحيطي)
• انخفاض عدد خلايا الدم البيضاء (قلة الكريات البيضاء)، وهو أحد أعراض الالتهاب في الجسم.
• صداع، دوخة
• التعب أو الضعف
• تغير في طعم الفم، دوق المعدن في الفم
• جفاف الفم، والشعور بالظمأ
• غثيان، قيء، فقدان الشهية
• ألم في البطن أو التشنج
• الإمساك أو الإسهال
إن احتمال ظهور هذه الأعراض الجانبية نتيجة لاستخدام التحميلات منخفض جدا لان نسبة نفاذ الميترونيدازول للدم ضئيلة جدا عند استخدامه عن طريق المهبل.
نادرا جدا ماتظهر اثار جانبية خطيرة.

إن لاحظت أي مما يلي، قومي بإخبار طبيبك:
• حروق، حكة، تهيج، افرازات، طفح جلدي في منطقة استخدام الدواء.
• ألم في البطن.
هذه هي الآثار الجانبية الخفيفة **لليماندا®**.
إن لاحظت أي آثار جانبية غير مدرجة في هذه النشرة، يرجى إبلاغ طبيبك أو الصيدلي الاقرب اليك.

5. كيفية تخزين ليماندا® ؟
يتم حفظ **ليماندا®** بعيدا عن متناول ومرأى الأطفال وداخل عبوته.
يحفظ في درجة حرارة تقل عن 25 درجة مئوية في درجة حرارة الغرفة.

يستخدم وفقا لتاريخ انتهاء الصلاحية.
لا تستخدم **ليماندا®** بعد تاريخ انتهاء الصلاحية المذكور على العبوة.
إن لاحظت وجود أخطاء في المنتج أو العلبة، فلا تقومي باستخدام **ليماندا®**.

القائمة :ا

رقم ° مقرر التسجيل : .....

صاحب مقرر التسجيل

وورلد ميديسين إيلاك سان في تيك .أس ,
,15 تموز ماهاليسي , كامي بولّو كاديسي رقم 50 , قونسلي , باقسيلار اسطنبول ,تركيا

المصنع المعبئ:

وورلد ميديسين إيلاك سان في تيك .أس
,15 تموز ماهاليسي , كامي بولّو كاديسي رقم 50 , قونسلي , باقسيلار اسطنبول ,تركيا

تاريخ اعتماد النشرة: 2020/05